



VACUNACIÓN EN EL EMBARAZO

Ana Santamaría



- 
- 
- ESPECIALMENTE INDICADAS Gripe y dTpa
 - RECOMENDADAS EN DETERMINADAS SITUACIONES
(vacunas inactivadas)
 - VACUNAS CONTRAINDICADAS (vacunas vivas atenuadas)



VACUNA DE LA GRIPE

VACUNA	TIPO DE VACUNA	HISTORIA VACUNAL	PAUTA	CONSIDERACIONES
Antigripal	Inactivada		1 dosis	En cualquier trimestre

VACUNA dTpa

VACUNA	TIPO DE VACUNA	HISTORIA VACUNAL	PAUTA	CONSIDERACIONES
		Vacunación completa	1 dosis (semana 27 a 36)	
dTpa	Inactivada	Vacunación incompleta	Completar, incluir dTpa (semana 27 a 36)	En cada gestación
		Vacunación desconocida/No vacunada	1ª Td (2º trimestre) 2ª dTpa (27-36 sem) 3ª Td (6 meses después)	



VACUNAS RECOMENDADAS EN SITUACIONES ESPECIALES

VACUNA	TIPO DE VACUNA	PAUTA	RECOMENDACIONES
Hepatitis A	Inactivada	2 dosis (0-6 meses)	<ul style="list-style-type: none">- Enf. hepáticas crónicas- Usuarias de drogas por VP- Viajes zonas endémicas

VACUNAS RECOMENDADAS EN SITUACIONES ESPECIALES

VACUNA	TIPO DE VACUNA	PAUTA	RECOMENDACIONES
Hepatitis B	Inactivada	3 dosis (0-1-6 meses) Evitar primer trimestre	EN EMBARAZADAS SERONEGATIVAS - Convivientes con personas con infección por VHB - Usuarias de drogas por VP - Más de una pareja sexual en los 6 meses previos - Insf. Renal - Infección por HIV - Receptoras de hemoderivados

VACUNAS RECOMENDADAS EN SITUACIONES ESPECIALES

VACUNA	TIPO DE VACUNA	PAUTA	RECOMENDACIONES
Antineumocócicas conjugada y polisacárida	Inactivada	1 dosis	<ul style="list-style-type: none">- Situaciones de epidemia- Asplenia- Drepanocitosis- Deficiencias de componentes del complemento- Fístulas LCR- Leucemia- Linfoma- Trasplante de órgano sólido o células hematopoyéticas- Enf. Renal crónica- Infección VIH

VACUNAS RECOMENDADAS EN SITUACIONES ESPECIALES

VACUNA	TIPO DE VACUNA	PAUTA	RECOMENDACIONES
Antimeningocócica conjugada y polisacárida	Inactivada	1 dosis	<ul style="list-style-type: none">- Situación de epidemia- Asplenia- Drepanocitosis- Deficiencias del complemento- Peregrinación a la Meca de Dic. a Junio

VACUNAS CONTRAINDICADAS EN EL EMBARAZO

VACUNA	TIPO DE VACUNA	CONSIDERACIONES
Papiloma humano	Inactivada	No hay datos de seguridad
Triple vírica (SRP)	Virus vivos	
Varicela	Virus vivos	
BCG	Bacilos vivos	
Antigripal intranasal	Virus vivos	

VACUNAS DEL VIAJERO

OCASIONALMENTE RECOMENDADAS DURANTE EL EMBARAZO

VACUNA	TIPO DE VACUNA	CONSIDERACIONES
Fiebre amarilla	Virus vivos	<ul style="list-style-type: none">- En situaciones de riesgo- Evitar embarazo tras vacunación 4 semanas- Evitar lactancia en < 12 meses
Rabia	Inactivada	<ul style="list-style-type: none">- Adm. Pre-exposición si zona de riesgo- Adm. Post-exposición contacto de riesgo
Fiebre tifoidea (polisacárida)	Inactivada	<ul style="list-style-type: none">- No hay estudios- Viaje zona endémica. Riesgo/beneficio
Fiebre tifoidea (oral)	V.Vivos atenuados	Contraindicada
Encefalitis japonesa	Inactivada	Si existe riesgo elevado de exposición No hay estudios
Encefalitis	Inactivada	Actividades al aire libre en zonas endémicas



VACUNAS OCASIONALMENTE RECOMENDADAS DURANTE EL EMBARAZO

VACUNA	TIPO DE VACUNA	PAUTA	RECOMENDACIONES
Poliomielitis	Inactivada	1 dosis	Viajes a zonas endémicas

- 
- <http://www.aepap.org/grupos/grupo-de-patología-infecciosa>

Vacunación en el embarazo

- Calendario de vacunación del adulto de la CAM
- Centros de vacunación internacional
 - Sanidad Exterior
 - H. La Paz/Carlos III
 - H 12 de Octubre
 - Centro de salud internacional del Ayuntamiento de Madrid