**ACTUALIZACIÓN EN LA ATENCION
DE CUIDADOS PALIATIVOS EN AP.
ABORDAJE INTEGRAL.
HOSPITAL GENERAL VILLALBA**

**CONTROL DE SÍNTOMAS
DIGESTIVOS EN EL PACIENTE
TERMINAL**

Dra M^aCarmen Antón Sanz

22 Febrero 2018

SÍNTOMAS DIGESTIVOS

1. CUIDADOS DE LA BOCA
2. NÁUSEAS Y VÓMITOS
3. ESTREÑIMIENTO
4. DIARREA

1. CUIDADOS DE LA BOCA

INTRODUCCIÓN

OBJETIVO

**ALCANZAR
EL MAYOR GRADO
DE BIENESTAR**

SALUD GINGIVAL

CUIDADOS BOCA

**ESPECIAL
ATENCIÓN**

- **SÍNTOMAS** Incómodos, Desagradables, Molestos...
- Problemas **ALIMENTACIÓN**
- Dificultades **HABLA**

CAUSAS ALTERACIONES CAVIDAD ORAL

- DEFICIENCIAS NUTRICIONALES
- DEFICIENCIAS HIDRATACIÓN
- PROCESOS INFECCIOSOS
- LESIONES TUMORALES
- HIGIENE ORAL INADECUADA
- FÁRMACOS (Atbcos, Opioides,..)
- RT sobre cavidad Oral

Alteraciones

DETRITUS

GINGIVITIS

PAPILITIS

TINCIONES

OBJETIVOS

- Cuidado Oral **HUMIDIFICADA y LIMPIA**
- Evitar molestias por **Sequedad**
- Reducir riesgo **Infecciones y Mal olor**
- Prevenir Rechazo Social por **HALITOSIS**
- Favorecer **Comunicación Enfermo**: Evitar Boca **Pastosa y Seca**
- Favorecer **Disfrute Alimentos**

PROPONER CONFORT AL PACIENTE

1. XEROSTOMÍA : BOCA SECA

LIMPIEZA

- Limpieza Boca 2v/día (mínimo) con cepillo Infantil suave
- ¡Es el utensilio más Eficaz! (Incluso en enfermos inconscientes)
- Se puede usar Torunda /dedo índice protegido)
- ¡Lengua! Cepillado suave

Control Mecánico de la Placa

Cepillos Dentales

1. XEROSTOMÍA : BOCA SECA

LIMPIEZA

Masticar trozos **PIÑA ENLATADA:**

– **ANANASA**

– Enzima Proteolítica que Limpia la Boca

1. XEROSTOMÍA : BOCA SECA

HUMIDIFICACIÓN

- **Aumento Ingesta Líquidos**
(Si tolera Paciente)
- **HUMIDIFICACIÓN MUCOSAS Y AUMENTO SALIVACIÓN:**
 - FRUTA FRÍA
 - CHICLES SIN AZÚCAR
 - CAMELOS ÁCIDOS LIMÓN
 - CUBITOS HIELO AROMATIZADOS (Agua Tónica, Grosellas)

1. XEROSTOMÍA : BOCA SECA

ENJUAGUES

- **SALIVA ARTIFICIAL:** (Farmacia)
 - METILCELULOSA, ESENCIA LIMÓN Y AGUA
- **MANZANILLA** (Anestésico Local) + **LIMÓN** (Estimula la Salivación):
 - 1 Litro Manzanilla + 1 Zumo Limón
 - **No Usar** si existe **DESHIDRATACIÓN:** Al intentar Estimular Glándulas Salivares produciría Dolor y Efecto Rebote Sequedad.

2. BOCA DOLOROSA

LIMPIEZA

- ENJUAGUES **MANZANILLA (SIN LIMÓN)** PARA NO ESCOZER MUCOSA
- PREPARADO:
 - 1 LITRO MANZANILLA
 - 1 FRASCO NISTATINA SUSPENSIÓN (60 ML)
 - 1-2 AMPOLLAS MEPIVACAINA
- CADA 4-6 Horas (Cuando sea necesario)
- Nevera. Desechar 24-48h

2. BOCA DOLOROSA

– ANÉSTESICOS LOCALES:

- LIDOCAINA VISCOSA 2% (Fórmula Magistral).
- Se puede Tragar.
- 15 min Antes de las Comidas

– EVITAR DENTADURA Postiza (Si es Molesta)

3. BOCA SUCIA / DETRITUS / COSTRAS

- **TORUNDA GASA EMPAPADA:**
 - $\frac{3}{4}$ S FISIOLÓGICO
 - $\frac{1}{4}$ AGUA OXIGENADA 10 VOLÚMENES
 - NO USO PROLONGADO: ESTOMATITIS

- **DILUCCIÓN BICARBONATO SÓDICO
+ SUERO SALINO:**
 - 2.5 CC EN 200 cc SF

3. BOCA SUCIA / DETRITUS / COSTRAS

- **SIDRA + SODA 50%**
- **¼ Pastilla VITAMINA C
EFERVESCENTE**
- **DENTADURAS (NOCHE): AGUA +
HIPOCLORITO SÓDICO 1%**

4. BOCA SANGRANTE

- **AGUA OXIGENADA Diluida 50% con Suero Salino**
- **“Toques” Suspensión SUCRAFALTO**
- **Alimentos Blandos, Cubitos Hielo o Líquidos Helados**
- **Cepillado y Enjuague “SUAVE”. Evitar movimientos bruscos y fuertes**

5. MICOSIS POR CANDIDAS

SÍNTOMAS

- Alteraciones GUSTO
- Sensación “ASPEREZA” en la Lengua
- Dificultad para DEGLUCIÓN

5. MICOSIS POR CANDIDAS

CAUSAS

- Tratamiento **CORTICOIDES**
- Tratamiento **QT**
- Tratamiento **RT**
- Tratamiento **ANTIBIÓTICOS**
- Dentaduras **MÓVILES**

5. MICOSIS POR CANDIDAS

TRATAMIENTO

- Enjuagues **SOLUCIÓN NISTATINA:**
5ml, 6 veces al día, 14 días
- La suspensión se reparta.
Impregnando la mucosa bucal
uniformemente.
- Retrasar Ingesta de Líquidos

5. MICOSIS POR CANDIDAS

PROFILAXIS

- No suspender el tratamiento totalmente. Existencia Múltiples Factores Riesgo
- DOSIS MANTENIMIENTO: Enjuagues SOLUCIÓN NISTATINA: 5ml, 3 veces al día.

5. MICOSIS POR CANDIDAS

TRATAMIENTO

CANDIDIASIS EXTENSA (DISFAGIA):

- **FLUCONAZOL:**
 - 1 día: 200 mg
 - 7-14 días: 100 mg
- **Alternativas:**
 - Ketoconazol
 - Itraconazol

2. NÁUSEAS Y VÓMITOS

2. NÁUSEAS Y VÓMITOS

- **FRECUENCIA:**
 - 30%-60% (Según series revisadas)
 - 100% como efecto 2^{ario}
- **FISIOPATOLOGÍA:**
 - + VAGAL
 - + CENTRO DEL VÓMITO
 - + ZONA GATILLO QUIMIORECEPTORA (suelo IV Ventrículo)
 - + SNC

NÁUSEAS Y VÓMITOS (ETIOLOGÍA)

TTO CON OPIOIDES (MORFINA) :

- RETRASO VACIAMIENTO GÁSTRICO
- ESTREÑIMIENTO
- + *DIRECTO* QUIMIRECEPTORES

RELACIÓN DOSIS-RESPUESTA:

TOXICIDAD EN VENTANA

TRATAMIENTO

- **MEDIDAS GENERALES**
 - CUIDADOS DE LA BOCA
 - ADECUAR LA DIETA

- **FARMACOLÓGICO:**
FÁRMACOS ANTIEMÉTICOS

MEDICACIÓN ANTIEMÉTICA (I)

FÁRMACOS	DOSIS	ADM		PRESENTACIÓN
NEUROLÉPTICOS				
– CLORPROMACINA	10-50 mg/4-8h	V.O	S.C	LARGACTIL [®]
– HALOPERIDOL	0.5-2.5 mg/12h	V.O	S.C	HALOPERIDOL [®]
PROGINÉTICOS				
– METOCLOPRAMIDA	5-10 mg/6-8h	V.O	S.C	PRIMPERAN [®]
– DOMPERIDONA	10-20 mg/6-8h	V.O		MOTILIUM [®]
ANTICOLINÉRGICOS				
– ESCOPOLAMINA	20-40mg/6-12h	V.O	S.C	BUSCAPINA [®]
		V.R		

NEUROLÉPTICOS (I)

HALOPERIDOL

ANTIEMÉTICO
ANSIOLÍTICO
ANTIPSIKÓTICO

De Elección:

Vómitos
provocados por
estímulo central

Emesis morfina
p ventana

NEUROLÉPTICOS (I)

HALOPERIDOL

- Adm: **V.O / S.C**
 - vida media **>16 h**
 - Dosis: **0.5-2.5 mg/12 h**
 - **> 5 mg es sedante**
 - Reacciones extrapiramidales
- **INICIO:**
 - 15 Gotas (1.5 mg)**
 - ½ amp sc (2.5 mg/12h)**
 - > poder antiemético**
 - < sedación**
 - que CLORPROMACINA**

NEUROLÉPTICOS (II)

CLORPROMACINA

- Mayor poder de **SEDACIÓN**:
Alternativa (haloperidol) si el paciente está muy ansioso / angustiado
- Adm: **V.O**
- Dosis: **10-50 mg/ 4-8 h**
- Inicio **15 gotas / noche**

LARGACTIL®

PROCINÉTICOS

INDICADOS

**VÓMITOS
PRODUCIDOS
POR UN RETRASO EN EL
VACIAMIENTO GÁSTRICO**

DOMPERIDONA

- **NO ATRAVIESA LA BARRERA HEMATOENCEFÁLICA**
(Menos posibilidades de dar reacciones extrapiramidales)
- **VIDA $\frac{1}{2}$ Más Larga (7h) que METOCLOPRAMIDA**

METOCLOPRAMIDA

VÍAS ADMINISTRACIÓN

- Oral (5-10 mg/6-8h)

- Subcutánea

(ROTAR EL LUGAR DE PUNCIÓN)

- Infusión continua

(No más de 24h)

- ❖ ATRAVIESA BARRERA HEMATOENCEFÁLICA (Posibilidad reacciones extrapiramidales)

ANTICOLINERGICOS

BUSCAPINA ESCOPOLAMINA

- Síndrome vertiginoso/Vómitos movimiento
- **OBS INTESTINAL**
- 10-20 mg/6h BUSCAPINA (**oral, sc, iv**)
- 0.5-1 MG/4-6h ESCOPOLAMINA

MEDICACIÓN ANTIEMÉTICA (II)

FÁRMACOS	DOSIS	ADM	PRESENTACIÓN
ANTIHIISTAMÍNICOS			
– HIDROXICINA	25 mg / 8h	V.O	ATARAX [®]
– DIMENHIDRINATO	50 mg / 4-6h	V.O	CINFAMAR [®]
ANTAGONISTAS 5HT₃			
– ONDASETRON	8 mg / 12h	V.O	ZOFRAN [®]
CORTICOIDES			
– DEXAMETASONA	1-4 mg / 8-12 h	V.O S.C.	FORTECORTIN [®]

ANTAGONISTAS 5HT₃

ONDASETRON

INDICADOS

FUNDAMENTALMENTE EN
PACIENTES QUE RECIBEN
TTO CON QT (RT)

ACCION CENTRAL Y PERIFERICA

CORTICOIDES

- ACCIÓN ANTIEMÉTICA **PROPIA** EN VÓMITOS DE INTENSIDAD MODERADA
- **ACCIÓN ADITIVA** CON LOS ANTIÉMETICOS SEÑALADOS

DMX

BENZODIAZEPINAS

- REDUCEN ANSIEDAD en VÓMITOS con **INFLUENCIA CORTICAL** :
 - OLOR
 - VISTA
 - SOBREPOTECCION FAMILIAR

**DIAZEPAN
LORAZEPAN
ALPRAZOLAM**

ESTRATEGIA TERAPÉUTICA

- CORRECCIÓN CAUSAS REVERSIBLES
- PRESCRIBIR EL ANTIEMÉTICO ADECUADO SEGÚN CAUSA
- ***¿VÍA DE ADMINISTRACIÓN?:***
 - SI EXISTE TOLERANCIA: **VÍA ORAL**
 - SI NO EXISTE TOLERANCIA: **VÍA SUBCUTÁNEA** (PALOMILLA / INFUSORES)
- **PROFILAXIS CON ANTIEMÉTICOS AL INICIO DEL TTO CON OPIOIDES**

3. ESTREÑIMIENTO

3. ESTREÑIMIENTO

- **FRECUENCIA:**

- 33%: INICIO
- 80%-90%: FASE TERMINAL

- **ETIOLOGÍA:** (2^{arias} TTO: OPIOIDES)

- **EVALUACIÓN**

- frecuencia, consistencia y dificultad
- comparar con el hábito previo
- síntomas acompañantes: vómitos, náuseas y dolor abd

TRATAMIENTO

- **CUIDADOS GENERALES:**
 - **INGESTA DE LÍQUIDOS***
 - **ACTIVIDAD FÍSICA*** (SI LO TOLERA)
 - **DIETA RICA EN FIBRA***
 - **RESPETAR LA INTIMIDAD DEL PACIENTE**
 - **DETECCIÓN TEMPRANA**
 - **INDICAR LAXANTES ANTE LA PRESCRIPCIÓN DE OPIOIDES**

LAXANTES

FÁRMACO

PRESENTACIÓN

DOSIS

LAXANTES OSMÓTICOS

– LACTULOSA	– LACTULOSA [®] , DUPHALAC [®]	5 ml / 8 h
– LACTITOL	– EMPORTAL [®] , OPONAF [®]	1 sobr / 8 h
– MACROGOL	– MOVICOL [®]	1 sobr/8h

LUBRICANTES

PARAFINA LÍQUIDA

HODERNAL[®]

10 ml / 24h

ACCIÓN LOCAL RECTO

– BISACOLIDO	– DULCO LAXO [®]	1 aplic / 24 h
– GLICERINA	– GLICEROL RECTAL	

LAXANTES

- **ESTIMULANTES:**
 - **SENOSIDOS**
 - *NO RECOMENDADOS DE FORMA CRONICA*
 - **PUEDEN PRODUCIR DOLOR CRONICO**

POSIBILIDADES DE TTO

- *AL INICIAR LA PRESCRIPCIÓN CON UN OPIOIDE, ADMINISTRAR PROFILÁCTICAMENTE UN LAXANTE:*
 - *LACTULOSA 5 ml / 8 h. (Subir dosis hasta 15ml/8h)*
- SI NO ES SUFICIENTE:
 - *LACTULOSA + HODERNAL®*
5 ml de cada susp cada 8 - 12 h. Max 15 ml
- SI NO ES SUFICIENTE:
 - *ENEMAS DE LIMPIEZA PERIÓDICOS*

POSIBILIDADES DE TTO: MOVICOL®

- *LAXANTE OSMÓTICO*
- *MACROGOL (13,3 gr) Polietilenglicol*
- *Dosis: 2-3 sobres / día*
- *Disolver cada sobre en 1/2 vaso Agua*

- *Más rápido y efectivo en pacientes con cancer*
- *Mayor evidencia científica que lactulosa*

4. DIARRHEA

4. DIARREA

- 10 % PACIENTES EN SITUACIÓN TERMINAL
- CAUSAS:
 - FARMACOLÓGICAS:
 - EXCESO EN LA UTILIZACIÓN LAXANTES
 - ANTIÁCIDOS
 - ANTIBIÓTICOS (DIARREA POR C DIFFICILE)
 - IMPACTACIÓN FECAL (PSEUDODIARREA)
 - OBSTRUCCIÓN INTESTINAL INCOMPLETA

TRATAMIENTO

- **CUIDADOS GENERALES:**

- HIDRATACIÓN ORAL
- PREVENIR ALTERACIONES PIEL
- MANTENER AL PACIENTE Y LA CAMA LIMPIOS Y SECOS
- PROTEGER CAMA CON EMPAPADORES, Y AL PACIENTE, SI LO ACEPTA, CON PAÑALES DE INCONTINENCIA

ANTIDIARREICOS INESPECÍFICOS

OPIOIDES

– LOPERAMIDA (FORTASEC®)

- *OPIOIDE DE ELECCIÓN*
COMO ANTIDIARREICO
- INICIO: 4mg.
- SEGUIDOS: 2mg dp
deposición
- 60 veces + potente que la
codeína como antidiarreico

– CODEÍNA

– MORFINA

AJUSTAR

DOSIS SEGÚN
TRATAMIENTO
ANALGÉSICO

ANTIDIARREICOS INESPECÍFICOS

- **INHIBIDORES DE LAS PG'S:**
INDICADOS EN LA DIARREA 2^{aria} RT
 - AAS
 - NAPROXENO

Gracias