

NUESTRA RED:

elEconomista.es**EcoDiario**
"Noticias y actualidad general"**EcoTrader**
"Dónde y cómo invertir"**Ecoaula.es**
"Universidades y formación"

cuenta AZUL

RBE nº 387/09

Cualquier día*Banesto.com***EcoDiario**

Salud

- [Portada](#)
- [Global](#)
- [España](#)
- [Bolsa y Economía](#)
- [Deportes](#)
- [Tecnología](#)
- [Medio Ambiente](#)
- [Cultura](#)
- [Gente y Estilo](#)
- [Motor](#)

• [ServiciosBlogs](#)Estás en: [Portada](#) » [Salud](#)

Buscar: _____ en EcoDiario.es

Buscar

Casi el 15 por ciento de las fracturas vertebrales de pacientes con osteoporosis requieren cirugía, según expertos

17:37 - 6/02/2009



Puntúa la noticia :



+ Nota de los usuarios: - (0 votos)

Entre el 10 y el 15 por ciento de las fracturas vertebrales de los pacientes con osteoporosis pasan por el quirófano para, mediante de una vertebroplastia o una cifoplastia, aliviar su dolor, según afirmó hoy el especialista de Columna del Servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatología de la **Fundación Jiménez Díaz**, Luis Álvarez Galovich, en el marco de las jornadas 'tratamientos de las fracturas vertebrales osteoporóticas' que se están celebrando hoy en Madrid.

MADRID, 6 (EUROPA PRESS)

Según explicó este experto, en declaraciones a Europa Press, la mayoría de fracturas suelen mejorar clínicamente con un tratamiento conservador con medicación, aunque existe "un porcentaje de pacientes que sufren una fuerte discapacidad funcional y se encuentran muy limitados para hacer su vida normal".

En estos casos, se utilizan técnicas de refuerzo vertebral con procedimientos percutáneos y mínimamente invasivos como las dos anteriormente citadas, que permiten una recuperación muy rápida. La vertebroplastia es un tratamiento mínimamente invasivo, guiado por imágenes, que se hace para fortalecer una vértebra fracturada, mientras que la cifoplastia utiliza un balón para hacer una cavidad restaurando la altura de la vértebra.

En este sentido, "antes se esperaba más a ver que el paciente no iba bien", si bien el avance de las tecnologías permite intervenir antes a estos pacientes "para mejorar la calidad de vida lo antes posible", señaló el doctor

Álvarez, ya que dada la seguridad de estos procedimientos se evita que el paciente se cure por si mismo en un periodo que puede alargarse de tres a seis meses.

Generalmente suelen ser pacientes de edad avanzada, de más de 65 años, en los que "el dolor derivado de la fractura es demasiado fuerte". El problema en estos casos es la mala calidad del hueso, lo que dificulta la intervención quirúrgica y obliga a aplicar dichas técnicas de refuerzo vertebral.

La Clínica Jiménez Díaz fue el primer centro en utilizar cirugía para curar estas lesiones en 1994 y, advirtió Álvarez, las últimas técnicas utilizadas permiten el uso de nuevos materiales, como cementos más específicos o biocementos --un material similar al hueso que se acaba reabsorbiendo en lugar de polimetilmetacrilato--, y la ampliación de su uso a otras patologías.

De hecho, entre las discusiones que se debaten en estas jornadas será unificar criterios de su uso --la vertebroplastia o la cifoplastia tienen una indicación precisa que depende de la localización específica de la fractura y de características radiológicas específicas-- ya que estima que en los próximos años puede aumentar el uso de estas intervenciones para mejorar "un problema que en estos pacientes es muy grave".

