



AZprensa.com

Diario digital de información sanitaria

¿Quiénes somos?

Aviso legal

Política de privacidad

CONVOCATORIAS

ENTREVISTAS

INFORMACIÓN SALUD

BECAS Y PREMIOS

ESTADÍSTICAS

CONGRESOS

ENLACES

FAVORITOS

RECEPCIÓN DE TITULARES

CONTACTE CON NOSOTROS

PÁGINA PRINCIPAL

Año nº 2248

Noticias

Los niños alérgicos a la leche tienen un 15% de posibilidades de sufrir reacciones alérgicas graves, según un estudio

Los niños alérgicos a proteínas de leche de vaca tienen un 15 por ciento de posibilidades de sufrir reacciones alérgicas accidentales graves, es decir, aquellas que afectan a más de un órgano o puede poner en peligro la vida del paciente, como la anafilaxia, la hipotensión o el broncoespasmo intenso, según un estudio realizado por investigadores de la **Fundación Jiménez Díaz** y el Hospital de La Paz, publicado en el 'Journal of Allergy and Clinical Immunology'.

Madrid, 28 de abril de 2009 (mpg/AZprensa.com)

Este trabajo, cuya autora principal es la especialista de La Paz Teresa Boyano, fue realizado sobre una muestra de 88 niños alérgicos a leche de vaca con una edad media de 32 meses, demostró que la frecuencia de estas reacciones en este colectivo era en un año del 40 por ciento, siendo un 15 por ciento graves, muchas sufridas en el hogar y en circunstancias de la vida cotidianas.

Asimismo, mostraron como factores de riesgo para reacciones graves los niveles elevados de IgE específica para leche de vaca y caseína (heteroproteína presente en la leche y sus derivados), y el asma.

La alergia alimentaria es un problema de prevalencia creciente que afecta especialmente a niños. La leche de vaca es uno de los alimentos más frecuentemente implicados, con una incidencia aproximada del 2 por ciento en el primer año de vida.

La leche natural y los lácteos, como el yogur o los helados, son relativamente fáciles de evitar. Sin embargo, las proteínas lácteas pueden constituir un ingrediente oculto en muchos alimentos elaborados y suponen un riesgo para los alérgicos.

Según Santiago Quirce, jefe de Servicio de Alergia del Hospital de La Paz, "para evitar las reacciones alérgicas accidentales es necesario un esfuerzo conjunto de profesionales sanitarios, padres y cuidadores, industria alimentaria y la administración pública para dar a conocer el problema". También considera, en este sentido, "importante hacer cumplir la normativa sobre etiquetado de los productos alimentarios".

Miércoles, 29 de Abril de 2009

Buscadores

POR PALABRAS: Indicar la palabra



POR FECHAS

Secciones

BIBLIOTECA ON-LINE

BANCO DE IMÁGENES

GLOSARIO



LEXICON



El farmacéutico



Tema del Mes
"TRASTORNOS DEL COMPORTAMIENTO ALIMENTARIO EN ADOLESCENTES"



Últimas novedades:
DICCIONARIO en 21 IDIOMAS – Banco de Imágenes... 27/08/2008

RECIBA LAS NOTICIAS DEL DIA EN SU BUZON. Suscríbese al servicio **gratuito** de recepción de titulares de AZprensa y **acceda directamente** a las noticias de su interés 27/08/2008



I Concurso de Marionetas
"Cómo se expresa la enfermedad mental"

EL PERIÓDICO DE LA FARMACIA
Avance noticias

