

Preparación para Test de aliento para la detección de **HELICOBACTER PYLORI**

Para obtener un resultado fiable, rogamos seguir y cumplir las siguientes instrucciones:

- Esta prueba **NO se debe realizar** si ha recibido y/o ha estado sometido en las **4 semanas previas** a:
 - Terapia antibiótica vía oral o inyectada.
 - Protectores de estómago tipo Inhibidores de la Bomba de Protones: omeprazol, lansoprazol, pantoprazol, rabeprazol y esomeprazol (por ejemplo: Nexium, Losec, Parizac, Miol, Emeproton, Gastrimud, Ceprandal, Norpramin, Omapren, Pepticum, Opiren, Estomil, Monolium, Proulco, Nucleosina, Pantectal, Ulcotental, Anagastra, etc.).
- Está permitido tomar otros **antiácidos/protectores gástricos**, consultándolo siempre con su médico.
- **Estar en ayuno** desde la noche anterior (solo podrá ingerir un poco de agua).
- **No lavarse los dientes.**
- **No fumar, comer chicle, ni realizar ejercicio físico** 30 minutos antes del inicio de la prueba ni durante la misma (su duración es de 1 hora).
- Se recomienda **consultar a su ginecólogo/a** en caso de estar embarazada y/o en periodo de lactancia.

VOLANTES

En caso de ser necesario, recuerde acudir al centro con los volantes cumplimentados y autorizados (consulte con su compañía si es necesario autorizar los volantes, ya que no todas las compañías lo cubren.)

**Ante cualquier duda, póngase en contacto
con el Laboratorio de Análisis clínicos**

Teléfono de consulta: en caso de tener dificultades para acceder al **Portal del Paciente Mi Quirónsalud**, podrá contactarnos a través del **teléfono 900 301 013**.