

Información al paciente Instilaciones vesicales

DESCRIPCIÓN Y PROPIEDADES

El tratamiento se administra mediante un procedimiento conocido como instilación intravesical que consiste en colocar una sonda en la vejiga urinaria e inyectar el medicamento a través de la misma mediante una jeringa. Una vez ha finalizado la instilación, se retira la sonda. Es muy importante que siga las instrucciones de su médico y que no abandone nunca el tratamiento por su cuenta sin antes consultar con él.

RECOMENDACIONES A SEGUIR DURANTE EL TRATAMIENTO

- NO BEBA NINGÚN LÍQUIDO DURANTE EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE LAS 4 HORAS PREVIAS A LA INSTILACIÓN Y LAS DOS HORAS POSTERIORES A LA MISMA.
- UNA VEZ LE HAYAN RETIRADO LA SONDA, DURANTE LAS DOS HORAS SIGUIENTES:
 - No debe orinar, ya que el medicamento debe permanecer durante ese tiempo en contacto con la vejiga.
 - Debe movilizarse el máximo posible para que el medicamento se distribuya bien por toda la vejiga. Si está encamado, debe cambiar de postura cada 15 min (boca arriba, boca abajo y a la inversa).
- TRANSCURRIDAS LAS DOS HORAS SIGUIENTES A LA INSTILACIÓN:
 - Beba abundantes líquidos durante 48 horas para facilitar la eliminación del medicamento por la orina y reducir la aparición de molestias.
 - Durante las primeras 6 horas, orine en posición de sentado (tanto si es hombre como si es mujer) y eche un vaso de lejía en el inodoro tras cada micción (SOLO SI LA MEDICACIÓN ADMINISTRADA ES BCG), dejándola actuar durante 15 min antes de descargar la cisterna. Lávese bien las manos tras cada micción.
 - Si mantiene relaciones sexuales, utilice preservativo durante los siete días posteriores a la instilación (SOLO SI LA MEDICACIÓN ADMINISTRADA ES BCG).

POSIBLES EFECTOS ADVERSOS DEL TRATAMIENTO

Los efectos adversos que pueden aparecer durante los días siguientes a la instilación suelen ser leves y transitorios y, por lo general, se resuelven de forma espontánea, aunque en ocasiones se administra algún tratamiento para aliviar los síntomas.

Los efectos adversos que se observan con mayor frecuencia son:

- Micciones frecuentes o dolorosas
- Malestar general
- Náuseas

Es importante que consulte inmediatamente con su médico o servicio de urgencias si:

- Los síntomas duran más de 48 horas.
- Tiene fiebre superior a 38°.
- Aparece sangre en la orina.
- Presenta dificultad respiratoria, hinchazón facial, erupción en la piel o dolor o hinchazón en las articulaciones.

IMPORTANTE

Informe siempre a su médico sobre otros medicamentos que esté tomando o vaya a tomar, especialmente antibióticos, medicamentos para la tuberculosis y fármacos corticosteroides.

El tratamiento está contraindicado durante el embarazo y lactancia.

RECUERDE

4 Horas antes	Durante las 2 horas posteriores	Pasadas 2 horas posteriores
No beba.	No beba.	Orine sentado durante las 6 horas siguientes.
	No orine.	Desinfecte el inodoro con lejía.
	Movílese o haga cambios posturales.	Lávese bien las manos tras cada micción.
		Beba abundantes líquidos durante 48 horas.



Accede online a tus resultados y gestiona tus citas en el área "Mi Quirónsalud" de quironsalud.es, o en nuestra App.

Hospital Universitario  **quirónsalud**
Madrid