

INFORMACIÓN PARA EL PACIENTE SOBRE LA TRIPLE TERAPIA DEL VHC CON TELAPREVIR (INCIVO®)

POSOLOGÍA DE LOS FÁRMACOS:

- **Pegasys (peginterferon alfa-2a):** 180 microgramos/ semana (SC en abdomen o muslo)

- **Copegus (cápsulas 200 mg):**

<65: 800 mg/día 2-0-2

65-85 kg: 1000 mg/día: 3-0-2

86-105 kg: 1200 mg/día: 3-0-3

>105 kg 1400 mg/día: 4-0-3

- **Incivo (375 mg): 2 comprimidos cada 8 horas** con alimentos . Se deben tomar los comprimidos enteros sin disolver, partir ni masticar.

Optimizan la absorción de Incivo alimentos ricos en grasas como la leche entera, galletas con chocolate, tostada con mantequilla y mermelada o con queso en crema, chocolate, nueces, quesos grasos, frutos secos, aceitunas, ...

Si olvidó tomar INCIVO

Si **no han transcurrido 4 horas** desde el momento en que tendría que haberse tomado la dosis olvidada, tome dos comprimidos inmediatamente. Tome siempre los comprimidos con algún alimento. Si **han transcurrido más de 4 horas**, omita esa dosis y tome la dosis siguiente de la forma acostumbrada. No tome una dosis doble para compensar las dosis olvidadas.

No deje de tomar INCIVO salvo que su médico le indique que interrumpa el tratamiento.

PREVENCIÓN DE EFECTOS SECUNDARIOS

Con la administración de Pegasys, especialmente las primeras semanas es muy frecuente la aparición de un cuadro pseudogripal con fiebre, dolores articulares y malestar general, para prevenirlo puede tomar antes de la administración paracetamol 1 g y repetir la dosis cada 8 horas si persisten los síntomas.

El uso de Incivo se asocia con frecuencia con la aparición de lesiones cutáneas que generalmente son leves. Para prevenirlas es importante mantener la piel correctamente hidratada, para lo cual se aconseja la aplicación al menos dos veces al día de crema hidratante. Si a pesar de eso aparecen lesiones o picor puede emplearse **Claral crema sobre las lesiones y tomar Atarax (un antihistamínico cada 6-8 horas)**

EFFECTOS SECUNDARIOS:

Interferón: falta de apetito, pérdida de peso, dolor de cabeza, insomnio, irritabilidad, depresión, mareos, dificultad de concentración, ansiedad, dificultad respiratoria, tos, náuseas, diarrea, dolor abdominal, alopecia, picor, dermatitis, sequedad de piel, dolores musculares y articulares, fiebre, escalofríos, reacción local en el punto de la inyección, astenia.

Ribavirina: infección viral, faringitis, anemia, disminución de los glóbulos blancos, hipotiroidismo, falta de apetito, depresión, insomnio, labilidad emocional, ansiedad, cefalea, mareo, dolor abdominal, tos, disnea, vómitos, alopecia, picor, dermatitis, sequedad de piel, dolores musculares y articulares, fiebre, escalofríos, astenia,

Telaprevir: los efectos secundarios descritos son:

- **Erupción cutánea:** Normalmente la erupción es leve o moderada, pero puede ser o llegar a ser intensa. **Debe consultar a su médico inmediatamente** si presenta una erupción o si una erupción previa empeora y si presenta otros síntomas además de la erupción cutánea tales como: fiebre, cansancio, hinchazón de la cara, inflamación de ganglios linfáticos, o si presenta una erupción cutánea generalizada con descamación de la piel que puede acompañarse de fiebre, síntomas parecidos a la gripe o ampollas en la boca, los ojos y/o los genitales.
- Cansancio, debilidad, dificultad para respirar, mareo y/o palpitaciones del corazón. Pueden ser síntomas de **anemia**.
- **Problemas cardiacos:** insuficiencia cardiaca, alteraciones del ritmo cardiaco, disminución de la frecuencia cardiaca, una alteración en el electrocardiograma (ECG) llamada "síndrome

de prolongación de QT” o antecedentes familiares de una enfermedad del corazón llamada “síndrome congénito de QT”. Es posible que su médico tenga que hacerle controles adicionales durante su tratamiento con INCIVO.

- Otros posibles efectos adversos son: inflamación dolorosa de las articulaciones (gota), alteraciones de la visión, sangrado por el ano, hinchazón de la cara, bajo recuento de plaquetas, disminución de los linfocitos (un tipo de glóbulo blanco), disminución de la actividad de la glándula tiroides, aumento del ácido úrico en la sangre, percepción alterada del sabor del medicamento

PRUEBAS DURANTE EL SEGUIMIENTO

Análisis de sangre: Su médico le hará análisis de sangre antes de iniciar el tratamiento y periódicamente durante el mismo para:

- Determinar la cantidad de virus presente en su sangre y valorar la eficacia y duración del tratamiento
- Comprobar si tiene anemia (disminución de los glóbulos rojos de la sangre).
- Comprobar si se han producido cambios en algunos valores de sus células sanguíneas o en la bioquímica sanguínea.

USO DE OTROS MEDICAMENTOS

INCIVO puede afectar y verse afectado por el uso simultáneo de muchos otros medicamentos. Antes de comenzar el tratamiento informe a su médico de cualquier fármaco que esté tomando y no inicie ningún tratamiento sin consultarlo previamente