

Información al paciente AIMOVIG® ERENUMAB

INDICACIÓN

AIMOVIG está indicado para la profilaxis de la migraña en adultos con al menos 4 días de migraña al mes.

POSOLOGIA

AIMOVIG se administra por **vía subcutánea** (debajo de la piel).


La dosis recomendada es de **70 mg cada 4 semanas**. Algunos pacientes pueden beneficiarse de una dosis de 140 mg cada 4 semanas. Cada dosis de 140 mg se administra mediante dos inyecciones subcutáneas de 70 mg cada una.

¿CÓMO se debe ADMINISTRAR AIMOVIG?

La administración de la inyección se debe realizar siguiendo los siguientes pasos:

1. Deje la jeringa precargada fuera de la nevera, a temperatura ambiente, **durante 30 minutos**, para evitar incomodidad en la administración.
2. Retire el auto inyector de la caja con precaución. No agite el auto inyector durante este proceso.
3. Compruebe el aspecto a través de la ventanita que presenta el dispositivo. Debe ser un líquido transparente y ligeramente amarillo. No lo utilice si observa, turbidez o partículas en el mismo.
4. Lávese las manos cuidadosamente, así como el sitio de inyección como se indica más adelante.

* Puede que observe una pequeña burbuja de aire en la jeringa precargada. No debe extraer la burbuja de aire, la inyección de la burbuja de aire no es perjudicial.



5. Desinfecte la piel de la zona de inyección usando un algodón con alcohol.
6. Cuando esté listo para inyectarse, retirar el capuchón blanco del dispositivo tirando hacia fuera. No dejar la aguja destapada más de 5 minutos.
7. Presione con el índice y el pulgar una zona de la piel para crear una superficie firme o, alternativamente, estirar la zona de inyección con el pulgar y los dedos en direcciones opuestas.
8. Inyecte el dispositivo con un ángulo de 90°. Apriete el botón morado para iniciar la administración y tras oír el "click", esperar hasta 15 segundos.



Accede online a tus resultados y gestiona tus citas en el área "Mi Quirónsalud" de quironsalud.es, o en nuestra App.


Hospital El Pilar
Grupo  quirónsalud

9. Al terminar la administración, retire el dispositivo y suelte la piel. Desinfecte de nuevo la zona con alcohol.

10. Una vez administrada la dosis, deseche el auto inyector.

11. Examine el sitio de inyección, si observa sangre, coloque cuidadosamente un algodón con el fin de limpiar la herida.

* Si la dosis prescrita es de 140 mg, repita los pasos mencionados anteriormente con un segundo dispositivo.



PRECAUCIONES

Consulte a su médico antes de empezar a usar Aimovig si tiene una enfermedad cardiovascular o alguna vez ha tenido una reacción alérgica al látex de caucho.

INTERACCIONES

No se han descrito interacciones.

Pregunte a su médico o farmacéutico antes de tomar un medicamento, vitamina o planta medicinal.

POSIBLES EFECTOS ADVERSOS

Los efectos adversos más frecuentes que podrían aparecer son:

- Estreñimiento
- Picor
- Espasmos musculares
- Reacciones en el lugar de inyección, tales como dolor, enrojecimiento e hinchazón en el lugar donde se administra la inyección. Suelen ser de carácter leve.

Comente con su médico o farmacéutico si presenta alguno de estos efectos adversos o cualquier otro que crea que puede estar relacionado con la medicación.



Accede online a tus resultados y gestiona tus citas en el área "Mi Quirónsalud" de quironsalud.es, o en nuestra App.

Hospital El Pilar
Grupo  quirónsalud

Avise rápidamente a su médico si tiene:

- Una reacción alérgica grave (enrojecimiento de la piel, dificultad para respirar,...).
- Signos de infección como tos, escalofríos, fiebre > 38°C, dificultad al orinar.
- Palpitaciones
- En caso de sobredosis.

CONSERVACIÓN

Mantenga las inyecciones en su envase original, dentro de la nevera (entre 2 y 8º) NO CONGELAR

CADUCIDAD

No utilizar después de la fecha de caducidad indicada en el envase.

ADVERTENCIAS

Mantenga los medicamentos fuera del alcance de los niños.

Este medicamento sólo puede conseguirse a través del Servicio de Farmacia de un Centro Hospitalario, con la receta que le hará su médico de ese Centro.

Las mujeres embarazadas deberán tener especial cuidado en evitar el contacto con el contenido de las jeringas.

RECOMENDACIONES AL PACIENTE

DÍAS	Nº INYECCIONES	
	70 mg	140 mg

Notas:

Este tríptico NO contiene toda la información de este fármaco y sólo pretende ser un resumen para ayudar al paciente con su tratamiento. No sustituye el prospecto.

Si tiene cualquier duda o precisa más información contacte con su médico o farmacéutico.

CÓMO CONTACTAR

Teléfono Farmacia: 93 236 05 00- Ext. 2673

Horario: 9:00 a 17:00 h.



Accede online a tus resultados y gestiona tus citas en el área "Mi Quirónsalud" de quironsalud.es, o en nuestra App.

Hospital El Pilar
Grupo  quirónsalud