

Información para el Paciente

Cirugía por Hipotonía Ocular

RECOMENDACIONES POSOPERATORIAS:

Para que se obtengan los resultados deseados necesitamos su colaboración. Después de la intervención debe seguir las siguientes recomendaciones:

- Si está en tratamiento con anticoagulantes orales, tipo SINTROM, debe consultar a su hematólogo para valorar la conveniencia de retirarlos o cambiarlos por heparina.
- No debe ingerir alimentos o bebidas durante las 6 horas anteriores a la intervención.
- Puede seguir con su medicación ocular habitual hasta el mismo día de la cirugía.
- Para evitar posibles infecciones, es recomendable ducharse el día antes de la intervención, y la misma mañana si es posible, con GERMISDIN antiséptico PH4 (ISDIN) poniendo especial atención al lavado de la cara en general y de las zonas alrededor de los ojos en particular.
- No utilice ningún tipo de maquillaje o crema en la cara o alrededor de los ojos, ni esmalte en las uñas.
- Recomendamos que asistan a la clínica sin anillos, colgantes o pendientes.
- Se rogaría que se limitase el número de acompañantes en la sala de espera a una o dos personas, en beneficio del bienestar y tranquilidad de los pacientes que serán intervenidos.
- Los pacientes usuarios de lentes de contacto deben interrumpir su uso durante los cinco días previos a la cirugía.



Accede online a tus resultados y gestiona tus citas en el área "Mi Quirónsalud" de quironsalud.es, o en nuestra App.

Hospital El Pilar
Grupo  quirónsalud