

## Información para el Paciente

### INYECCIÓN INTRAVÍTREA

#### ¿QUÉ ES?

Es una **inyección** de medicamento en el ojo. El interior del ojo está lleno de un líquido gelatinoso (humor vítreo). Durante este procedimiento, su proveedor de atención médica inyecta medicamento en el humor vítreo, cerca de la retina en la parte posterior del ojo.

- Es normal notar sensación de roce o “arenilla” uno o dos días tras la cirugía. No existe ningún inconveniente en ver televisión o leer si se lo permite su visión.
- Instilar el colirio según las pautas marcadas por su oftalmólogo. Desde que usted despierte y hasta ser revisado deberá seguir utilizándolo.
- Si considera además necesario el empleo de algún otro tratamiento se lo hará saber y le indicaran las pautas oportunas.
- Además, **puede emplear algún analgésico vía oral para reducir las molestias (distinto de aspirina, por ejemplo, paracetamol o metamizol magnésico: nolotil)** en el supuesto de notar síntomas diferentes a los que ya le han sido explicados como habituales (escozor, lagrimeo, visión borrosa, sensibilidad aumentada a la luz y deslumbramiento).

#### OBSERVE

- Si inflamación o sangrado o mal olor en la zona.
- Si dolor importante que no cede con analgesia.
- Si temperatura mayor de 38º C.

**PÓNGASE EN CONTACTO CON SU ENFERMERA / MÉDICO DE REFERENCIA O ACUDA AL SERVICIO DE URGENCIAS.**



Accede online a tus resultados y gestiona tus citas en el área “Mi Quirónsalud” de [quironsalud.es](http://quironsalud.es), o en nuestra App.

Hospital El Pilar  
Grupo  quirónsalud