

Información para el Paciente

PTERIGION

¿QUÉ ES?

El procedimiento consiste en colocar el ojo del paciente bajo un microscopio. A continuación, se le indica que dirija la visión hacia un punto determinado. El cirujano realiza la escisión del **pterigion** y coloca una pequeña porción de la conjuntiva del mismo paciente sobre el lugar en el que se encontraba la lesión.

- **No debe frotarse los ojos o cerrar con fuerza los párpados**, así como tampoco agachar la cabeza ni para calzarse ni realizar esfuerzos físicos, puesto que podría desplazarse la lente intraocular o subir la presión del ojo intervenido y abrir la herida quirúrgica.
- Es normal notar sensación de roce o “arenilla” uno o dos días tras la cirugía. No existe ningún inconveniente en ver televisión o leer si se lo permite su visión.
- Sería recomendable no dormir durante las primeras noches sobre el lado del ojo intervenido, haciéndolo boca arriba o del lado contrario.
- Además, **puede emplear algún analgésico vía oral para reducir las molestias (distinto de aspirina, por ejemplo paracetamol o metamizol magnésico: nolotil)** en el supuesto de notar síntomas diferentes a los que ya le han sido explicados como habituales (escozor, lagrimeo, visión borrosa, sensibilidad aumentada a la luz y deslumbramiento).

OBSERVE

- Si inflamación o mal olor en la zona o secreciones.
- Pérdida de visión.
- Si dolor importante que no cede con analgesia.
- Si temperatura mayor de 38º C.

PÓNGASE EN CONTACTO CON SU ENFERMERA / MÉDICO DE REFERENCIA O ACUDA AL



Accede online a tus resultados y gestiona tus citas en el área “Mi Quirónsalud” de quironsalud.es, o en nuestra App.

Hospital El Pilar
Grupo  quirónsalud