

Informació per al Pacient

PROVES DE FUNCIÓ PLAQUETAR

Aquest document proporciona informació sobre com realitzar les proves de funció plaquetar. A través d'una sèrie de preguntes i respostes, pretén solucionar alguns dels dubtes més freqüents i aportar la informació necessària.

¿QUÈ SÓN LES PROVES DE FUNCIÓ PLAQUETAR?

Les proves de funció plaquetar (PFA) són proves per determinar la capacitat de les plaquetes per agregar-se (unir-se i formar un tap que impedeixi el sagnat) en contacte amb diferents medis . Es realitza mitjançant una anàlisi.

¿QUINES PRECAUCIONS S'HA DE TENIR?

Hi ha determinats fàrmacs, compostos, aliments o suplementes dietètics que poden alterar les proves de funció plaquetària. Per això és important **evitar durant 12 dies abans de la prova:**

1. Agents estabilitzadors de la membrana
 - Antihistamínic
 - Antidepressius tricíclics
 - Antagonistes alfa i beta-bloquejadors
 - Anestèsics locals
2. Antibiòtics en dosis elevades
 - Penicil·lines i cefalosporines
3. Agents que augmenten la activitat del AMPc
 - Dipyridamol
 - Aminofilina
 - Prostaciclina
4. Altres
 - Heparina
 - Etanol
 - Fenotiacides
 - Dextrà



Accede online a tus resultados y gestiona tus citas en el área "Mi Quirónsalud" de quironsalud.es, o en nuestra App.

Hospital El Pilar
Grupo  quirónsalud

- Fibrats
- All, gingebre, ginseng, alfals, camamilla, ginkgo biloba
- Vitamina E
- Calcitonina

Si ha de realitzar-se aquestes proves, no oblidis, davant de qualsevol canvi de tractament d'informar el metge que el prescriu. Pot ser-li d'utilitat aquest document.



Accede online a tus resultados y gestiona tus citas en el área "Mi Quirónsalud" de quironsalud.es, o en nuestra App.

Hospital El Pilar
Grupo  quirónsalud