



Conozca nuestro Instituto de Reproducción Asistida, técnicas y equipo médico en quironsalud.es/reproduccionasistida

quironsalud.es    

Reproducción Asistida

Hospital
quirónsalud
Málaga

Hospital Quirónsalud Málaga
Avenida Imperio Argentina, 1
29004 Málaga
951 940 000

Quirónsalud, la salud persona a persona.

Más de 100 hospitales, institutos y centros médicos dedicados a tu salud en 13 regiones:
Andalucía | Aragón | Baleares | Canarias | Castilla La Mancha | Cataluña |
Comunidad Valenciana | Extremadura | Galicia | Madrid | Murcia | Navarra | País Vasco

¿En qué consiste un ciclo de Inseminación Artificial (IA)?

Instituto de Reproducción Asistida
Información para el paciente



Hospital  **quirónsalud**
Málaga

Un ciclo de Inseminación Artificial (IA), paso a paso

Ecografía basal

Su ginecólogo le realizará una ecografía basal al inicio del ciclo para confirmar que todo está dentro de la normalidad y no hay contraindicación para iniciar la estimulación ovárica.



Inicio de la estimulación ovárica

Si en la visita anterior el estudio ecográfico fue normal, tendrá que empezar con la estimulación ovárica del 3^{er} al 5^o día de regla. Las inyecciones son de administración subcutánea. Si el ciclo es natural, sólo precisará controles ecográficos.




Control de la inseminación

El primer control ecográfico se realiza entre el 5^o ó 6^o día de haber empezado con las inyecciones. A partir de aquí los controles son cada 48 horas a menos que su ginecólogo considere oportuno otro momento.


Ovulación

Una vez que los folículos han alcanzado un tamaño adecuado, su ginecólogo le indicará la fecha y hora de la administración de la medicación para la ovulación, como por ejemplo, Ovitrelle® 250. Esto desencadena la ovulación en un plazo de 37-40 horas. También puede hacerse con controles hormonales en algunos casos.



Inseminación

La introducción intrauterina del semen conyugal/donante se programa un día y medio después de la administración de la medicación para la ovulación y no se necesita anestesia para su realización. La paciente podrá hacer vida normal tras ésta. No es doloroso.



La prueba de embarazo

Se realiza a las 2 semanas de la inseminación mediante una prueba de sangre u orina.

Según los resultados, le indicaremos los pasos siguientes.

