


RECOMENDACIONES PARA UN PACIENTE INTERVENIDO DE SEPTOPLASTIA

CUIDADOS GENERALES



- Desde el momento del alta debe permanecer en reposo domiciliario los primeros dos días después de la intervención.
- Evitará hacer esfuerzos físicos, como levantar pesos durante dos semanas.
- No puede conducir ninguna clase de vehículos ni utilizar maquinaria peligrosa hasta pasadas 72 horas de la intervención.
- No puede ingerir bebidas alcohólicas hasta pasados los tres primeros días. La dieta debe ser blanda y en cantidad moderada las primeras 24 horas después de la intervención.
- Es normal que tenga la boca reseca al no poder respirar por la nariz, así como algo de dolor e inflamación que cederá con los analgésicos que le hemos dado.
- Puede notar inflamado el labio superior y es normal si se le hinchan un poco los ojos.
- Es recomendable dormir un poco incorporado, para facilitar la respiración.
- En caso de tener que estornudar lo hará con la boca abierta.
- Deberá evitar el estreñimiento; en caso necesario utilizará laxantes suaves.
- Rezumará algo de sangre y secreciones por el taponamiento. Es normal. Si le resulta cómodo, puede colocar una gasa bajo la nariz, sujeta con esparadrapo de papel, para recoger las secreciones y cambiarla a menudo.
- En caso de que antes de la intervención estuviera tomando aspirina u otro antiagregante, consultará con su médico el momento de reiniciar el tratamiento.

OBSERVE

- En caso de sangrado abundante por nariz o boca, dolor muy intenso que no cede con los analgésicos recomendados, o fiebre superior a 38º,

PONGASE EN CONTACTO CON SU MEDICO O ACUDA A URGENCIAS